

FORAGEMAX BLANDINGER 2024

ForageMax®- og HorseMax®-blandinger. Frøblandinger i tabellen er angivet i % af kg. Leveres i standardpakninger à 10 kg.

Frøblanding 21-53 er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget.

De øvrige er specialblandinger fra DLF.

| BENYTTELSE | TIL AREALER | JORBUNDS-FORHOLD | TIDLIGHED | FORAGEMAX® BLANDING | LUCERNE | RØDKLØVER | | HVIDKLØVER | | | RAJSVINGEL | | STRANDSVINGE | HYBRIDRA-JGRÆS | ALM. RAJSVINGEL TIDLIG | ALM. RAJSVINGEL MIDDLETLIDIG | | ALM. RAJSVINGEL SILDIG | | | TIMOTÉ | | ENGSVINGEL | HUNDEGRÆS | RØDSVINGEL | ENGRAPGRÆS | CIKORIE | KÆLLINGETAND | LANCETVEJBRED | KOMMEN | UDSÆDSMÆNGDE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----------|------|------------|-----------|----------|------------|--------|--------------|----------------|------------------------|------------------------------|--------|------------------------|--------|----------|--------|-------|------------|-----------|-------------|------------|---------|--------------|---------------|--------|--------------|----------|----------|---------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----|----|---|---|----|
| | | | | | MEZZO | CALLISTO | AMOS | BRIANNA | SILVESTER | RIVENDEL | HOSTYN | FOJTAN | HIPAST | SWEETY | TETRATOP | KIMBER | MAKURA | ABOSAN 1 | GARBOR | OVAMBO 1 | BOVINI | SAQUI | HUMBI 1 | THEGN | SUMMERGRAZE | WINNETOU | LAURA | DONATA | CONDOLIN | BALIN | SPADONA | LOTANOVA | ECOTAIN® | PROCHAN | FRØANDEL - BÆLGPLANTER | ETABLERING MED DÆKSÆD FORÅR | ETABLERING I REBESTAND | | | | | |
| Afgræsning | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 21 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 20 | | 20 | | 10 | 10 | | | | | | | 29 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | |
| Afgræsning | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 22 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 14 | 13 | 28 | | | | | | | | | 42 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | |
| Afgræsning | Permanente | Alm./varierende | Sildig | 24* | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | | | 10 | 10 | | | | | | 24 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | | |
| Afgræsning | Permanente | Tør | Middeltidlig | 25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 20 | | | | 22 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | | |
| Afgræsning | Permanente | Fugtig | Sildig | 26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 26 | | 10 | 10 | | | 21 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | | |
| Afgræsning | I omdrift | Alm. god | Sildig | DLF Biodiversitet* | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 25 | 6 | 8 | | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | |
| Slæt og afgræsning | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 33 | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | | 40 | 15 | 15 | | | | | | | | | 0 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | |
| Slæt og afgræsning | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | Tetratop | | | | | | | | | | | | | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | | | | | | | | | 0 | 22-26 | 26-31 | | | | | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 34 Mere Mælk Rød | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | |
| Slæt og afgræsning | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | |
| Slæt og afgræsning | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | Sydvestjyden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | |
| Slæt og afgræsning | Permanente | Alm./tør/fugtig | Sildig | 36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | |
| Slæt og afgræsning | Permanente | Meget fugtig | Middeltidlig | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | |
| Slæt og afgræsning | Permanente | Alm./tør/fugtig | Middeltidlig | LandboNord Klima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 20-25 | 24-30 | | | | | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 40 Robust Rød | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 24-28 | 29-34 | | | | | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 41 Robust Hvid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 24-28 | 29-34 | | | | | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 13 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Tidlig | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | LandboNord Rød | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 7 | 15 | 15 | 28 | 27 | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 7 | 45 | 18 | 19 | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | LandboNord Hvid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 12 | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | Morsø 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 5 | 33 | 16 | 16 | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm./tør/fugtig | Middeltidlig/sildig | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 | | 40 | 30 | 15 | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm./tør/fugtig | Middeltidlig/sildig | 50 Robust strandsvingel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 37 | 38 | 15 | | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm./tør/fugtig | Middeltidlig/sildig | Sydvestjyden Struktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 55 | | 20 | 15 | | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | Sydvestjyden Rød | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | | | 25 | 10 | 27 | 25 | | | |
| Får, afgræsning | I omdrift | Alm./varierende | Sildig | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | 25 | 15 | 20 | | | | |
| Får, slæt og afgræsning | I omdrift | Alm. god | Tidlig | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 25 | | | | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |

| HORSEMAX® BLANDING | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Slæt | Permanente | Alm./varierende | Sildig | Slæt |
| Struktur og afgræsning | Permanente | Alm./varierende | Middeltidlig/sildig | Fiber |
| Struktur og afgræsning | Permanente | Alm./varierende | Middeltidlig/sildig | Fiber Pronitro |
| Struktur og afgræsning | Permanente | Alm./varierende | Middeltidlig/sildig | Fiber uden rajgræs |
| Struktur og afgr. m. urter | Permanente | Alm./varierende | Tidlig/middeltidlig | Solfaxi */** |
| Langsomt voksende og slidstærk | Permanente | Alm./varierende | Middeltidlig/sildig | Low*/*** |

*Afhængig af forsyningsituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremgå af emballagen.

** Blandinger med under 25 pct bægplanter (frøandel).

*** Solfaxi indeholder desuden 3 % Alm. rapgræs DASAS og 3 % Sneglebælg VIRGO.

**** Low indeholder desuden 3 % Alm. rapgræs DASAS, 3 % Sneglebælg VIRGO og 5 % Esparsette

1) Rajsvingel (strandsvtype) FOJTAN er coated med ProNitro®. 10 kg HorseMax Fiber indeholder derfor 9,2 kg frø og 0,8 kg gødning mv.

2) Sælges så længe lager Høj FK NDF sort fra DLF. 32"