

VÅRSÆD 2023

19 stærke sorter fra Vestjyllands Andel



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

10 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME**
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsmiddel, bejdsset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdsset.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræs).
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
- 8 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.
- 9 MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING**
Erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortvalg.
- 10 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne; forædlernes eneste indtægtskilde.

DEN MEGET HØJT YDENDE SORT SKYWAY ER ANERKENDT I DANISH PREFERRED

Dansk avl af maltbyg er anerkendt i hele verden på grund af en stærk faglig dyrkningspraksis og et dansk klima, der er ideelt til produktion af maltbyg. Mildt vejr og en lang vækstsæson giver store ensartede kerner med et højt stivelsesindhold.

Dansk maltbyg er samtidig kendt for sit høje certificeringsniveau, og stort set alt dansk maltbyg kommer fra certificerede frø, hvilket sikrer en ensartet råvare, som er en nøglefaktor for produktion af malt i verdensklasse.

Danish Preferred 

DANISH PREFERRED er et dansk program for industrigodkendelse af maltbygssorter, og formålet med programmet er at

skabe et præcist, klart og samtidig markedsbaseret program, som i høj grad bygger på kædens egen vurdering af potentialet i en given sort. Dette sikres ved at stille krav om

egenbetaling og høje krav til opformering af sorten. I Danish Preferred er der repræsentanter fra både planteformidlere, kornhandlere, grovvareforretninger og maltbygindustrien.

En blåstempling af en maltbygkandidat gennem Danish Preferred er en rigtig stærk indikator for, at en ny maltbygssort er på vej ud til flere markeder. Nordic Seed er meget glade for at kunne præsentere SKYWAY som anerkendt i Danish Preferred i sommeren 2022.



SKYWAY er forædlet af Nordic Seed, og ligger helt i toppen af de danske

landsforsøg igennem de seneste år. Samtidig repræsenterer sorten en meget ensartet og høj kvalitet på alle jordtyper. Vi er hermed klar til at indtage maltbygmarkedet med Skyway.

UDSÆDSMÆNGDER

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER

ART	TKV INTERVAL	ANBEFALET PLANTETAL, PL/M ² *	ANBEFALET SÅDYBDE, CM **
VÅRBYG, MALT	40-55	250-300	3-4
VÅRBYG, FODER	40-55	275-325	3-4
HAVRE	40-50	275-325	3-4
VÅRHVEDE	45-60	375-425	3-4
VÅRRAPS	-	50-60	2
HESTEBØNNER ***	400-600	40-50	8-10
MARKÆRT ***	250-350	50-70	6-8

*) Ved undersåning af græsfrø og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved god næringsværdi i jorden. Lavest angivne plantetal anvendes ultimo marts og højest angivne plantetal ultimo april.

**) For dyb og uensartet såning resulterer i svage blege planter og koster nemt 2-3 hkg./ha i udbyttetab i vårkorn.

***) Ved højt ukrudtstryk anbefales altid højest angivne plantetal og samtidig dyb såning i bælgssæd, da det giver bedre mulighed for behandling med glyphosat før fremspiring. Dyb såning kan også være med til at sikre tilstrækkelig fugt til ensartet fremvækst.

FORVENTET MARKSPIRING

Foruden sæsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med sæsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, for høj såhastighed og dårligt såbed.

Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring.

Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde.

SÅRÆKKEFØLGE I TJENLIG JORD

ART	RISIKO
HAVRE	Sen såning koster meget udbytte, øger skal-andelen og risikoen for angreb af fritfluer.
VÅRHVEDE	Sen såning øger risikoen for angreb af bygfluer og en sen høst med dårlig kerne kvalitet.
BÆLGSSÆD	Sen såning øger risikoen for kraftige angreb af bladlus, nedsat udbytte og en senere høst.
VÅRBYG	Sen såning efter medio april koster udbytte.

Etablering af vårkorn og bælgssæd

Det er altid mere vigtigt, at jorden er tjenlig end at så tidligt. Vårsæd tåler en kold jord, men den må ikke samtidig være våd og sammenkørt.



$$\frac{\text{Tusindkornsvægt} \times \text{ønsket plantetal (pl./m}^2\text{)}}{\text{Forventet markspiringsprocent}}$$

= Kg udsæd pr. ha



SKYWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Ny meget højt ydende sort til malt
- Anerkendt af Danish Preferred
- Meget høj sortering - velegnet på alle jordtyper
- Meget høj hektolitervægt
- Middel sygdomsmodtagelighed
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

SORTERING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


AKSNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*								OBSERVATIONSPARCELLER				
	Kerne-udbytte	Hekto-litervægt	Råprotein		Sortering af kerner over 2,5 mm	Lejesæd	Aksned-knækning	Stråned-knækning	Meldug	Bygrust	Skoldplet	Bladplet	Ramularia
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0-10			% dækning				
2022	103	70,1	9,6	740,1	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,5	1,0	11,0
2021	103	68,7	10,4	662,1	98,0	1,6	1,0	6,0	0,0	21,0	7,0	4,1	18,0
2020	104	70,2	10,2	726,5	98,0	1,0	1,0	2,0	0,0	15,0	9,0	0,0	20,0
GNS 2020-2022	103	69,7	10,1	709,6	98,0	0,9	0,7	2,7	0,0	21,7	5,5	1,7	16,3

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	0,3 l/ha Prosaro.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKADEDYR	Ved forekomster af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

RGT PLANET

VÅRBYG

FORÆDLER: RAGT



EGENSKABER

- Anerkendt maltbygssort
- God sortering
- Modtagelig for svampe
- Middel stråstyrke
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

SORTERING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


AKSNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*								OBSERVATIONSPARCELLER				
	Kerne-udbytte	Hekto-litervægt	Råprotein		Sortering af kerner over 2,5 mm	Lejesæd	Aksned-knækning	Stråned-knækning	Meldug	Bygrust	Skoldplet	Bladplet	Ramularia
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0-10			% dækning				
2022	100	69,9	9,8	734,7	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,0	15,0	8,0
2021	98	67,8	10,3	626,9	97,0	1,1	1,0	7,0	0,0	12,0	2,2	18,0	13,0
2020	102	69,1	10,2	711,8	97,0	0,9	1,0	2,0	0,0	8,0	7,0	26,0	26,0
GNS 2020-2022	100	68,9	10,1	691,1	97,3	0,7	0,7	3,0	0,0	13,3	7,4	19,7	15,7

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	0,3 l/ha Prosaro.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKADEDYR	Ved forekomster af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

LAUREATE

VÅRBYG

FORÆDLER: SYNGENTA SEEDS GMBH



EGENSKABER

- Højt ydende anerkendt maltbygssort
- Høj sortering
- Middel sygdomsmodtagelighed
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

SORTERING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


AKSNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*								OBSERVATIONSPARCELLER				
	Kerne-udbytte	Hekto-litervægt	Råprotein		Sortering af kerner over 2,5 mm	Lejesæd	Aksned-knækning	Stråned-knækning	Meldug	Bygrust	Skoldplet	Bladplet	Ramularia
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0-10			% dækning				
2022	103	68,0	9,7	747,0	98,0	0,0	0,0	1,0	0,0	16,0	3,0	0,2	6,0
2021	104	66,8	10,4	669,2	98,0	1,0	2,0	4,0	0,0	5,0	2,6	0,1	8,0
2020	103	68,4	10,1	711,7	97,0	1,0	2,0	2,0	0,0	3,9	5,0	0,0	20,0
GNS 2020-2022	103	67,7	10,1	709,3	97,7	0,7	1,3	2,3	0,0	8,3	3,5	0,1	11,3

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	0,25 l/ha Prosaro.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKADEDYR	Ved forekomster af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.



EGENSKABER

- Meget tidlig modning
- Velegnet til udlæg og før vinterraps
- Stabilt ydende sort over flere år
- Høj hektolitervægt
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj


AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*								OBSERVATIONSPARCELLER				
	Kerne-udbytte	Hekto-litervægt	Råprotein		Sortering af kerner over 2,5 mm	Lejesæd	Aksned-knækning	Stråned-knækning	Meldug	Bygrust	Skoldplet	Bladplet	Ramularia
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0-10			% dækning				
2022	100	69,3	10,2	759,5	95,0	0,0	0,0	2,0	0,0	13,0	1,0	0,0	18,0
2021	101	68,8	10,6	664,0	96,0	0,8	2,0	5,0	0,0	14,0	2,7	0,0	23,0
2020	99	69,7	10,6	718,1	97,0	0,8	2,0	1,0	0,0	4,5	15,0	0,0	38,0
GNS 2020-2022	100	69,3	10,5	713,9	96,3	0,5	1,3	2,7	0,0	10,5	6,2	0,0	26,3

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	Ved højt sygdomstryk: 0,25 l/ha Prosaro.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	Ved højt N-niveau og/eller kraftig afgrøde: 0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKADEDYR	Ved forekomster af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FIREFOXX

VÅRBYG

FORÆDLER: ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG



EGENSKABER

- Ny meget højt ydende sort til malt – Non-GN
- Forventes anerkendt af Danish Preferred
- Høj sortering
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

SORTERING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


AKSNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*								OBSERVATIONSPARCELLER				
	Kerne-udbytte	Hekto-litervægt	Råprotein		Sortering af kerner over 2,5 mm	Lejesæd	Aksned-knækning	Stråned-knækning	Meldug	Bygrust	Skoldplet	Bladplet	Ramularia
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0-10			% dækning				
2022	104	68,1	9,5	735,6	97,0	0,0	0,0	1,0	0,0	27,0	0,3	0,0	10,0
2021	105	67,0	10,5	680,1	97,0	0,8	1,0	5,0	0,0	10,0	2,1	0,2	7,0
2020	105	68,3	9,9	714,4	97,0	0,8	1,0	1,0	0,0	9,0	13,0	0,0	30,0
GNS 2020-2022	105	67,8	10,0	710,0	97,0	0,5	0,7	2,3	0,0	15,3	5,1	0,1	15,7

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	0,25 l/ha Prosaro.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKADEDYR	Ved forekomster af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

STAIRWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Meget højt ydende sort over flere år
- Høj hektolitervægt
- Lav sygdomsmodtagelighed
- Middel stråstyrke
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj


AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*								OBSERVATIONSPARCELLER				
	Kerne-udbytte	Hekto-litervægt	Råprotein		Sortering af kerner over 2,5 mm	Lejesæd	Aksned-knækning	Stråned-knækning	Meldug	Bygrust	Skoldplet	Bladplet	Ramularia
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0-10			% dækning				
2022	103	69,0	9,8	753,9	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,0	0,0	10,0
2021	102	68,0	10,3	653,1	94,0	0,6	1,0	7,0	0,0	3,6	2,1	0,1	6,0
2020	105	69,0	9,9	713,6	95,0	0,9	1,0	3,0	0,0	5,0	4,5	0,4	22,0
GNS 2020-2022	103	68,7	10,0	706,9	94,0	0,5	0,7	3,3	0,0	5,9	2,9	0,2	12,7

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	Hold øje med evt. svampeangreb.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	Ved højt N-niveau og/eller kraftig afgrøde: 0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKADEDYR	Ved forekomster af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.



EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- God hektoliter vægt
- Middel sygdomsmodtagelighed
- God stråstyrke
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj


AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG							OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅ-PROTEIN	SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts*	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2022	102	68,3	9,8	95,0	0,0	0,0	1,8	0,0	14,0	0,25	2,0	12,0
2021	103	67,3	10,2	95,0	0,0	0,3	1,0	0,0	9,0	6,0	4,8	11,0
2020	105	68,4	9,9	96,0	0,0	2,0	4,8	0,0	10,0	10,0	1,3	20,0
GNS 2020-2022	103	68	10,0	95,3	0,0	0,8	2,5	0,0	11,0	5,4	2,7	14,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	0,25 l/ha Prosaro.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	Ved højt N-niveau og/eller kraftig afgrøde: 0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKAEDYR	Ved forekomster af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

SORTSBLANDING

VÅRBYG, STAIRWAY-KWS ABBIE-FIREFOXX

FORÆDLER: NORDIC SEED, ACKERMANN
SAATZUCHT GMBH & CO. KG, KWS LOCHOW GMBH



EGENSKABER

- Højtydende blanding i hkg og protein
- En stærk "cocktail" til opfodring
- Høj hektolitervægt
- Mindre svampeangreb og forebyggelse af resistens
- Risikospredning ift. vækstsæsonens betingelser

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj


AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

	UDBYTTEFORSØG*		
	KERNEUDBYTTE, HKG/HA	KERNEUDBYTTE, HKG/HA	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE, HKG/HA
	Gns. 2020-2022	2022	2022
STAIRWAY	83,3	90,5	7,5
KWS ABBIE	82,8	89,2	5,6
FIREFOXX	84,1	91,1	5,9
GNS BLANDING	83,4	90,3	6,3

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	Hold øje med evt. svampeangreb.	0,4 l Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	Ved højt N-niveau og/eller kraftig afgrøde: 0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKADEDYR	Ved forekomst af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

SYMPHONY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



GRYN



FODER



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort gennem flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din nærmeste grovvareforretning
- Middel hektolitervægt
- Middel sygdomsmodtagelighed
- God stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig


STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning	
2022	99	53,9	11,4	859,5	0,1	46,0	9,0
2021	100	51,1	11,8	700,1	0,0	7,0	8,0
2020	100	56,1	10,8	747,3	0,2	33,0	6,0
GNS 2020-2022	100	53,7	11,3	769,0	0,1	28,7	7,7

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 11 - 12	St. 32	St. 33 - 37
SVAMPESYGDOMME		Hold øje med svampe.	0,25 l/ha Prosaro + 0,15 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING* (IKKE I GRYNHAVRE)		0,2-0,3 l/ha Moddus M.	
SKADEDYR	Ved risiko for fritfluer i sent sået havre: 0,25 kg/ha Lamdex.		

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder og grynhavre.

DOMINIK

HAVRE

FORÆDLER: SAATZUCHT B. BAUER GMBH



EGENSKABER

- Dobbelt nematoderesistent
- Anerkendt sort
- Lav hektolitervægt
- Middel sygdomsmodtagelighed
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig


STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning	
2022	92	53,0	11,8	824,5	0,1	34,0	7,0
2021	90	50,0	12,3	657,6	0,0	8,0	3,7
2020	97	55,8	11,1	751,0	0,3	38,0	3,7
GNS 2020-2022	91	52,0	12,0	768,9	0,1	25,3	5,9

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 11 - 12	St. 32	St. 33 - 37
SVAMPESYGDOMME		Hold øje med svampe.	0,25 l/ha Prosaro + 0,15 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING* (IKKE I GRYNHAVRE)		0,2-0,3 l/ha Moddus M.	
SKADEDYR	Ved risiko for fritfluer i sent sået havre: 0,25 kg/ha Lamdex.		

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

DELFIN

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



GRYN



FODER



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort gennem flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din nærmeste grovvareforretning
- Lav modtagelighed for meldug
- God stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig


STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning	
2022	99	55,2	11,6	868,7	0,0	0,0	6,0
2021	100	52,6	12,0	708,9	0,1	0,0	8,0
2020	103	56,7	11,1	791,6	0,4	0,0	3,7
GNS 2020-2022	101	54,8	11,6	789,7	0,2	0,0	5,9

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 11 - 12	St. 32	St. 33 - 37
SVAMPESYGDOMME		Hold øje med svampe.	0,25 l/ha Prosaro + 0,15 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING* (IKKE I GRYNHAVRE)		0,2-0,3 l/ha Moddus M.	
SKADEDYR	Ved risiko for fritfluer i sent sået havre: 0,25 kg/ha Lamdex.		

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder og grynhavre.

WPB OSCAR

HAVRE

FORÆDLER: WIERSUM PLANTBREEDING, NL



EGENSKABER

- Ny godt ydende sort
- Høj hektolitervægt
- Middel modtagelighed for sygdomme
- Høj stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig


STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE		HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning	
2022	96		55,1	11,6	843,0	0,0	13,0	4,3
2021	103		52,8	11,9	721,2	0,2	0,0	5,0
2020	101	105	57,6	11,0	774,2	0,0	9,0	2,4
GNS 2021-2022	100		55,2	11,5	779,5	0,1	7,3	3,9

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdisafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 11 - 12	St. 32	St. 33 - 37
SVAMPESYGDOMME		Hold øje med bladplet.	0,25 l/ha Prosaro + 0,15 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING* (IKKE I GRYNHAVRE)		0,2-0,3 l/ha Moddus M.	
SKADEDYR	Ved risiko for fritfluer i sent sået havre: 0,25 kg/ha Lamdex.		

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder og grynhavre.

THORUS

VÅRHVEDE

FORÆDLER: STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

GULRUST

Lav modtag. Modtagelig


STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



EGENSKABER

- Stabilt udbytte over flere år
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes som brødhvede - kontakt din nærmeste grovvareforretning
- Lav modtagelighed for gulrust
- Høj stråstyrke

KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning		
2022	100	81,4	11,5	807,4	0,4	0,0	3,3	0,0
2021	100	79,4	12,5	728,9	1,0	0,0	7,0	0,0
2020	100	81,7	11,5	740,0	0,0	0,0	18,0	0,0
GNS 2020-2022	100	80,8	11,8	758,8	0,5	0,0	9,4	0,0

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 20 - 31	St. 32	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME		Ved forekomst af meldug og/eller gulrust: 0,3 l/ha Prosaro.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Orius Gold.
VÆKSTREGULERING (IKKE I BRØDHVEDE)*		0,3-0,4 l/ha Moddus M.	
SKADEDYR	Ved risiko for bygfluer: 0,15 kg/ha Lamdex.		

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder og brødhvede.



GREENWAY

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Højst ydende sort over flere år
- Halvbladløs med grønne frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Lavt indhold af trypsininhibitorer

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

ÆRTER UDVIKLINGSSTADIER



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN I TØRSTOF	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% af ts	g	cm	karakter 0-10
2022	110	22,5	312,0	77,0	2,9
2021	109	23,7	263,0	65,0	1,3
2020	104	21,6	322,0	54,0	5,5
2020-2022	108	22,6	299,0	65,3	3,2

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	FREMSPIRINGSFASEN	BEGYNDENDE BLOMSTRING	BLOMSTRINGSFASEN
SVAMPESYGDOMME		Ved gråskimmel og/eller ærteskimmel: 1,0 kg/ha Signum WG.	
SKADEDYR	Ved forekomst af bladrandbiller: 0,15 kg/ha Lamdex.		Ved forekomst af mere end 15-20% angrebne planter af bladlus og/eller hvis tærsklen for ærteviklere er overskredet: 0,2 kg/ha Lamdex.

INGRID MARKÆRT

FORÆDLER: LANTMÄNNEN SW SEED AB



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort over flere år
- Halvbladløs med gule frø
- Høj afgrødehøjde ved høst
- Høj stængelstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

ÆRTER UDVIKLINGSSTADIER



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN I TØRSTOF	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% af ts	g	cm	karakter 0-10
2022	101	23,2	304,0	83,0	2,0
2021	103	23,9	271,0	70,0	0,0
2020	100	22,2	303,0	75,0	3,9
2020-2022	101	23,1	292,7	76,0	2,0

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	FREMSPIRINGSFASEN	BEGYNDENDE BLOMSTRING	BLOMSTRINGSFASEN
SVAMPESYGDOMME		Ved gråskimmel og/eller ærteskimmel: 1,0 kg/ha Signum WG.	
SKADEDYR	Ved forekomst af bladrandbiller: 0,15 kg/ha Lamdex.		Ved forekomst af mere end 15-20% angrebne planter af bladlus og/eller hvis tærsklen for ærteviklere er overskredet: 0,2 kg/ha Lamdex.

ORCHESTRA

MARKÆRT

FORÆDLER: RAGT



EGENSKABER

- Højt ydende sort over flere år
- Halvbladløs med gule frø
- Højt proteinindhold

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

ÆRTER UDVIKLINGSSTADIER



KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN I TØRSTOF	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% af ts	g	cm	karakter 0-10
2022	99	24,9	298,0	73,0	2,1
2021	105	25,5	265,0	54,0	1,1
2020	113	23,4	317,0	53,0	5,3
2020-2022	106	24,6	293,3	60,0	2,8

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN


BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	FREMSPIRINGSFASEN	BEGYNDENDE BLOMSTRING	BLOMSTRINGSFASEN
SVAMPESYGDOMME		Ved gråskimmel og/eller ærteskimmel: 1,0 kg/ha Signum WG.	
SKADEDYR	Ved forekomst af bladrandbiller: 0,15 kg/ha Lamdex.		Ved forekomst af mere end 15-20% angrebne planter af bladlus og/eller hvis tærsklen for ærteviklere er overskredet: 0,2 kg/ha Lamdex.

JAVLO MARKÆRT

FORÆDLER: S.A. FLORIMOND DESPREZ



UDBYTTEPOTENTIALE




RÅPROTEIN



STIVELSE I TØRSTOF



KG TØRSTOF PR. FE



AFGRØDEHØJDE VED HØST



EGENSKABER

- Velafprøvet sort til helsæd
- Høj foderværdi
- Højt proteinudbytte
- Højest ydende sort til helsæd i seneste landsforsøg i 2019

Javlo markært har været på markedet i godt og vel 20 år. Sorten var i afprøvning i Landsforsøg 1999-2007, og har ligeledes været afprøvet i økologiske forsøg samt i Landsforsøg med ærte-helsæd i perioden 2000-2005. I 2019 blev der igen afprøvet sorter til helsæd, hvor Javlo var den højstydende.

Javlo har i hele afprøvningsperioden med ærte-helsæd ydet et højt stabilt udbytte, et højt proteinindhold samt en god afgrøde-højde ved høst.

LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



EGENSKABER

- Højt udbytte over flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN I TØRSTOF	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% af ts	g	cm	karakter 0-10
2022	107	29,0	555,0	115,0	0,3
2021	105	27,8	494,0	80,0	0,8
2020	98	28,6	519,0	136,0	0,6
2020-2022	103	28,5	522,7	110,3	0,6

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	FREMSPIRINGSFASEN	BLOMSTRINGSFASEN
SVAMPESYGDOMME		0,3 l/ha Pictor Active + 0,25 l/ha Orius Gold.* Under fugtige forhold bør der anvendes samme behandling senere i blomstringsfasen.
SKADEDYR	Ved forekomst af kåltrips og/eller bladrandbiller: 0,15 kg/ha Lamdex.	Ved mere end 10-15% angrebne planter med bladlus: 0,2 l/ha Mavrik. Evt. behov for opfølgning.

* Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.

DAISY

HESTEBØNNE

FORÆDLER: P.H. PETERSEN



EGENSKABER

- Højt udbytte over flere år
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Tidlig til middeltidlig modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN I TØRSTOF	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% af ts	g	cm	karakter 0-10
2022	105	29,9	574,0	117,0	0,5
2021	102	29,6	496,0	82,0	0,8
2020	105	29,8	573,0	135,0	1,1
2020-2022	104	29,8	547,7	111,3	0,8

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	FREMSPIRINGSFASEN	BLOMSTRINGSFASEN
SVAMPESYGDOMME		0,3 l/ha Pictor Active + 0,25 l/ha Orius Gold.* Under fugtige forhold bør der anvendes samme behandling senere i blomstringsfasen.
SKADEDYR	Ved forekomst af kåltrips og/eller bladrandbiller: 0,15 kg/ha Lamdex.	Ved mere end 10-15% angrebne planter med bladlus: 0,2 l/ha Mavrik. Evt. behov for opfølgning.

* Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.

Afdelinger

Nedenfor finder du adresser og telefonnumre på alle vores afdelinger.

På **www.vja.dk** kan du læse mere om, hvilke ydelser hver enkelt afdelinger tilbyder, samt hvor på Danmarkskortet de enkelte afdelinger er placeret.

Asp	Langhøjvej 10, 7600 Struer	tlf. 9748 7444
Astrup	Borrisvej 5A, 6900 Skjern	tlf. 9736 4011
Bedsted	Linnetsgade 11, 7755 Bedsted Thy	tlf. 4630 0870
Borris	Kornvænget 11 6900 Skjern	tlf. 9681 6322
Brande	Uhrevej 5, 7330 Brande	tlf. 4630 0880
Errested	Thomashusvej 12, 6100 Haderslev	tlf. 7452 2795
Fjølstervang	Overvej 15, 6933 Kibæk	tlf. 4630 0877
Gesten	Gestenvej 47A, 6621 Gesten	tlf. 4630 0888
Grønhøj	Mønstedvej 13, 7470 Karup	tlf. 8666 1244
Hee	Holstebrovej 106A, 6950 Ringkøbing	tlf. 9733 5011
Herning	Industrivej Nord 9B, 7400 Herning	tlf. 9736 6444
Hjerm	Lindeborgvej 7, 7560 Hjerm	tlf. 9746 4200
Kirsdal	Kirsdalvej 2A, 7280 Sdr. Felding	tlf. 9719 8788
Kølkær	Hammerumvej 29, 7400 Herning	tlf. 9714 7377
Kåstrup	Greenlab 39, 7860 Spøttrup	tlf. 5855 0855
Løvlund	Utoftvej 2, 7190 Billund	tlf. 7533 1433
Nordenskov	Kærgårdsvej 30, 6800 Varde	tlf. 7529 8411
Næsbjerg	Knoldeflodvej 99, 6800 Varde	tlf. 7526 7166
Ringkøbing	Vester Kær 16, 6950 Ringkøbing	tlf. 9732 1011
Snejbjerg	Snerlundvej 2, 7400 Herning	tlf. 9716 1244
Spjald	Spjaldgårdsvej 1, 6971 Spjald	tlf. 9738 1577
Sunds	Thorupvej 30, 7451 Sunds	tlf. 9714 1485
Tvis	Skautrupvej 32B, 7500 Holstebro	tlf. 8881 8800
Vamdrup	Pantonevej 10, 6580 Vamdrup	tlf. 7692 2900
Vildbjerg	Pugdalsevej 2, 7480 Vildbjerg	tlf. 9713 1322



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation